

Когда детям и подросткам необходимо делать прививки?

Возраст	НерВ Гепатит В	мАТ к РСВ	DTaP/ Tdap Дифтерия, столбняк, коклюш (судорожный кашель)	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> (гемофильная инфекция) типа В	IPV Полиомиелит	PCV Пневмококковая конъюгированная вакцина	RV Ротавирус	MMR Корь, паротит, краснуха	Varicella Ветряная оспа	НерА Гепатит А	COVID-19	Лихорадка денге	ВПЧ Вирус папилломы человека	Men- ACWY Менингококковая конъюгатная вакцина	MenB	Influenza Грипп
При рождении	✓	✓ ² (0–7 мес.)														
2 месяца	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
4 месяца	✓ ¹		✓	✓	✓	✓	✓									
6 месяцев	✓ (6–18 мес.)		✓	✓ ¹	✓ (6–18 мес.)	✓	✓ ¹									✓ (6 мес. и старше)
8 месяцев																
12 месяцев		✓ ² (8–19 мес.)		✓ (12–15 мес.)		✓ (12–15 мес.)		✓ (12–15 мес.)	✓ (12–15 мес.)	✓✓ (2 дозы вводят с интервалом в 6 месяцев в возрасте 12–23 месяцев.)						
15 месяцев			✓ ³ (15–18 мес.)													
18 месяцев																
19–23 месяца																
4–6 лет			✓		✓			✓	✓	Вакцина НерА (2 дозы) также рекомендуется для детей и подростков, которые ранее не прививались	Вакцина против COVID-19 рекомендуется всем в возрасте 6 месяцев и старше					
7–10 лет																
11–12 лет			✓ (Tdap)									✓✓✓ ⁵ Вакцину против лихорадки денге рекомендуется делать определенной категории детей	✓✓ ^{6,7}	✓		Прививку против гриппа рекомендуется делать каждый год, начиная с возраста 6 месяцев и старше
13–15 лет																
16–18 лет														✓	✓✓ 8,9,10	

Одна доза каждую осень или зиму. Некоторым детям младше 9 лет может потребоваться 2 дозы. Спросите у врача вашего ребенка, требуется ли ему больше 1 дозы.

- ПРИМЕЧАНИЯ**
- Вашему ребенку может и не потребоваться эта доза, в зависимости от марки вакцины, которую использует ваш лечащий врач.
 - Младенцы, матери которых не проходили вакцинацию против РСВ во время беременности, и которые младше 8 месяцев, должны получать профилактическое антитело к РСВ (мАТ к РСВ) до или во время сезона РСВ (как правило, с октября по март). Некоторым детям из группы высокого риска (в возрасте от 8 до 19 месяцев) потребуется введение мАТ к РСВ до второго сезона РСВ.
 - Эта доза вакцины DTaP может вводиться уже в возрасте 12 месяцев, если с момента введения предыдущей дозы прошло 6 месяцев.

- Детям в возрасте 5 лет или старше обычно требуется только одна доза. Количество доз для детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет определяется в зависимости от марки вакцины.
- Детям в возрасте от 9 до 16 лет, проживающим в Пуэрто-Рико, на Американском Самоа, Американских Виргинских островах, в Федеративных штатах Микронезии, Республике Маршалловы острова и Республике Палау, у которых ранее была лабораторно подтвержденная инфекция лихорадки денге, рекомендуется пройти серию из 3 доз вакцины против лихорадки денге.
- Вакцину против ВПЧ обычно вводят в возрасте 11 или 12 лет, однако ее можно вводить и с возраста 9 лет.

- Детям с определенными заболеваниями потребуются третья доза.
- Эту вакцину можно вводить здоровым подросткам. Ее также рекомендуют для подростков с определенными заболеваниями.
- В зависимости от рекомендации врача, вашему ребенку-подростку может потребоваться дополнительная доза.
- Если необходимо ввести обе вакцины MenACWY и MenB, можно использовать комбинированную вакцину MenABCWY.



www.immunize.org/wp-content/uploads/catg.d/p4050-07.pdf

"When Do Children and Teens Need Vaccinations?"

Item #P4050-07 Russian (12/18/2023)



Scan for PDF